



## S2K konsenzus HDGO: Postupanje kod sumnje / koronavirusne infekcije u trudnoći

30 responses

Znanstvenici su razvili algoritam za postupanje s trudnicama koje su u riziku od infekcije koronavirusom tip 2 / SARS-CoV-2 i traže da ga usvoje zdravstvene ustanove.

30 responses



- Slažem se. HDGO treba objaviti prijedlog stručnih smjernica, koje zdravstvena ustanova usvaja u predloženom ili modificiranom obliku / ovisno o uvjetima.
- Ne slažem se. HDGO ne treba objavljivati stručne smjernice na ovu temu.
- Nisam siguran/-na jesu li ove smjernice u nadležnosti HDGO.

Iskustvo s drugim koronavirusnim epidemijama ukazuje da su trudnice u riziku od teške bolesti, pa premda još nisu utvrđeni slučajevi vertikalnog prenošenja, HDGO predlaže da se pažljivo nadgleda aktualna trudnoća.

30 responses




- Slažem se.
- Ne slažem se.

## Preporuke za postupanje kod sumnje na koronavirusnu infekciju u trudnoći


Trudnica koja je u posljednjih 14 dana putovala u zemlju koja je bila pogodjena koronavirusnom infekcijom ili koja je bila u bliskom kontaktu s osobom s potvrđenom infekcijom trebala bi biti testirana testom amplifikacije nukleinske kiseline SARS-CoV-2, čak i ako nema simptome.

30 responses




Asimptomatske trudnice s laboratorijski potvrđenom koronavirusnom infekcijom trebale bi se samostalno nadgledati kod kuće najmanje 14 dana.

30 responses




Trudnice koje su bile u kontaktu s oboljelim, trudnice a asimptomatskom bolesti ili one koje se oporavljaju od blage bolesti treba nadzirati tako da se dodatno u dvomjesečnim intervalima učini ultrazvučna biometrija i Dopplerski protoci.

30 responses




Trudnice s koronavirusnom pneumonijom treba liječiti multidisciplinarni tim u tercijarnoj zdravstvenoj ustanovi.

30 responses




Za trudnice s potvrđenom infekcijom, vrijeme porođaja treba individualizirati ovisno o tjednu trudnoće i uvjetima majke, fetusa i porođaja.

30 responses



Prednost treba uvijek kada je to moguće dati vaginalnom porođaju s indukcijom i mogućim operativnim zahvatom radi izbjegavanja iscrpljenosti majke.


30 responses



## Novorođenčad i dojenje


Novorođenčad majki pozitivnih na koronavirus treba izolirati najmanje 14 dana ili dok se virusa ne ukloni.

30 responses




Preporuke za dojenje: Ne preporučuje se dojenje.

30 responses



Preporuke za dojenje: Preporučuje se izdajanje i hranjenje bebe od strane zdrave osobe.

30 responses




Preporuke treba prilagoditi lokalnim zdravstvenim ustanovama i sukladno dalnjem ažuriranju smjernica za koronavirus u trudnoći.

30 responses




Trudnoće komplikirane koronavirusnom infekcijom treba smatrati visokorizičnim a majka, fetalni i razvoj novorođenčeta trebaju biti pod strogim nadzorom.

30 responses



U zaključku je potrebno reći da trebamo više podataka o potencijalnom vertikalnom prenošenju, utjecaju na fetus kada se koronavirusna infekcija dogodi tijekom drugog ili trećeg tromjesečja, stopi teške infekcije kod majke i dugoročnom praćenju.

30 responses



Zahvala